

Краткая сравнительная характеристика опросников Мориски-Грина MMAS-4, Мориски MMAS-8, и количественной оценки приверженности к лечению ОКОП-25

	MMAS-4	MMAS-8	ОКОП-25
Год первой публикации	1983	1988	2008
Описание методологии	<i>Morisky D. E., Green L. W., Levine D. M. Concurrent and predictive validity of a self-reported measure of medication adherence // Med. Care. 1986; 24: 67–74</i>	<i>Morisky D. E., Ang A., Krousel-Wood M., Ward H. J. Predictive validity of a medication adherence measure in an outpatient setting // J. Clin. Hypertens (Greenwich). 2008; 10 (5): 348–354</i>	<i>Николаев, Н. А. Доказательная гипертензиология: количественная оценка результата антигипертензивной терапии / Н. А. Николаев. – М.: Изд. дом «Академия Естествознания», 2008. – 92 с</i>
Чувствительность	44%	93%	93%
Специфичность	47%	53%	78%
Воспроизводимость	н/д	н/д	94%
Шкала	качественная	качественная	количественная
Единица измерения	балл	балл	%
Оценка приверженности к лекарственной терапии	есть	есть	есть
Оценка приверженности к медицинскому сопровождению	невозможна	невозможна	есть
Оценка приверженности к модификации образа жизни	невозможна	невозможна	есть
Интегральная оценка приверженности к лечению	невозможна	невозможна	есть
Оценка потенциальной приверженности у здоровых респондентов	невозможна	невозможна	возможна
Авторские ограничения к использованию опросника	нет	есть	нет